

Ezüstháló alkalmazása antibakteriális hatékonyság és az antibiotikum-rezisztencia csökkentésének lehetősége

Intézmény: Ápolás Extra Egyesület, Napfény Gyöngye Nyugdíjasház Dóc
Szerzők: Rostás Norbert



0. nap



0.-35 nap



36.-60. nap



61.-84 nap

Bevezetés

93 éves nőbeteg, ismert hypothyreosis, krónikus veseelégtelenség, hypertonia és arrhythmia mellett, otthoni elesést követően a jobb térd mediális oldalán 10×6 cm-es, exudatív, részben granulációs szövetrel fedett, fibrines lepedékes traumás sebet szenvedett el. A sérülést 2024. október 18-án dokumentáltuk, a gyógyulási folyamatot rendszeresen nyomon követtük. A sebkezelés során Atrauman Ag hálót, Zetuvit E sebpárnát és Omnifix elastic rögzítést alkalmaztunk. A kötéscseréket kétnaponta végeztük, **az asepszis és antiszepszis szabályainak megfelelően**, fiziológiás sóoldatos sebtörléssel, Octenisept oldatos fertőtlenítést és steril mull-lappal végzett tamponálást követően. Az eset célja a sebgyógyulás dokumentálása idős, multimorbid beteg esetében, modern kötszerek és strukturált sebellátási protokoll alkalmazásával.

Eset

A seb exudatív jellegű volt, felszínét fibrines lepedék fedte, részben granulációs szövetrel. A kezelést modern, ezüsttartalmú kötszerekkel (Atrauman Ag, Zetuvit E), antiszeptikus sebtörléssel és kétnaponta végzett kötéscserével végeztük. A gyógyulási folyamatot fotódokumentációval kísértük 2024. októberétől kezdődően.

0. nap:

Nyitott, exudatív seb. Kezelés megkezdése előtt.

Nap 0-35. nap:

Jelentős javulás. Sebalap tisztulást, gyulladásos zóna csökkent, megindult az aktív granuláció. Seb szélek záródása előrehaladott.

Nap 35.-60.nap: Terápia

A sebellátás során ezüsttartalmú Atrauman Ag hálóval, nedvszívó Zetuvit E kötszerrel és Omnifix elastic rögzítéssel biztosítottuk a megfelelő fedést. A kötéscseréket kétnaponta végeztük, az aseptikus és antiszeptikus elvek betartásával. A beavatkozások során fiziológiás sóoldatos lemosást, Octenisepttel történő fertőtlenítést és steril mull-lappal történő tamponálást alkalmaztunk.

Nap 60-84. nap: Sebzáródás

A sebfelszín teljes záródását követően a **Dermatico Total Barrier** krémet alkalmaztuk a regenerált bőrfelület védelmére és megerősítésére. A krém segíti a barrierfunkció helyreállítását, csökkenti az irritáció esélyét, és támogatja a bőr természetes védekező képességét. Természetes kivonatait és ezüstkolloid tartalma hozzájárulnak a bőrfelszín egyensúlyának fenntartásához, elősegítve a gyógyult terület tisztán tartását és a későbbi irritációk megelőzését.

Konklúzió

A megfelelően strukturált sebellátás idős, multimorbid betegnél is eredményes gyógyuláshoz vezethet. A sebzáródást követő barrierkrém alkalmazása segítheti a regenerált bőr védelmét és a relapszus megelőzését. Az eset alátámasztja a protokollal támogatott, fokozatos ellátás fontosságát.

Hivatkozás

- 1). Lo, S.F. et al. (2008) *Journal of Clinical Nursing*, 17(15), pp.1973–1985.
- 2). Rippon, M.G. et al. (2022) *Journal of Wound Care*, 31(7), pp.540–547.
- 3). Rostás, N. et al. (2024) 'Fast-acting topical dermatitis treatment with colloidal silver and natural anti-inflammatory extracts'. *Presented at WONCA Europe Conference 2024*, Dublin, Ireland, 25–28 June 2024.