


Miért legyen első választás a negatívnyomás-terápia?

Szentkereszty Zs, Susán Zs, Zádori G, Ötvös Cs, Tóth Cs, Bernscherer Gy, Tóth D.

DE ÁOK Sebészeti Intézet

Miért legyen első választás a negatívnyomás-terápia?




- QL
- Eredményesség
- Idő
- Pénz
- Evidencia

Quality of Life

- A betegek jól tolerálják a kezelést
 - Fájdalom
 - Kötéscserék
- A betegek nem élik meg a szeptikus sebek kellemetlen szagát
- Könnyebb a mobilizáció
- Kényelmesebb az ápoló személyzetnek





Eredményesség

- **Primer sebzárás aránya nagyobb**
 - **Nyitotthas-kezelés esetén kevesebb a szövődmény**
 - **Vérzés**
 - **Bélsipoly**
 - **Fertőzés**
- **Damage control surgery**


Eredményesség

- **Primer sebzárás aránya nagyobb**
 - **Nincs szükség plasztikai sebészeti beavatkozásra (fasciitis necr.)**
 - **Gyorsabb a seb feltisztulása, sarjadzása**
 - **Folyamatos „sebszűkítés”**
 - **Drain visszahagyása mellett sebzárás**

Eredményesség

- **Eredményesség**
 - **Endo-vákuum kezelés**
 - Varratelégtelenségek kezelése
 - Nyelőcső
 - Végbél
 - Perforatio
 - Nyelőcső
 - Rectovaginalis fistula





Idő



- **Rövidebb kezelési idő**
 - Mert az NPWT gyorsítja a sebgyógyulást
- **Rövidebb ITO-s tartózkodás**
 - Mert az NPWT „lokalizálja” a szeptikus folyamatokat
- **Ápolással, utókezeléssel eltöltött idő rövidebb**
 - Kiesik a napi többszöri kötéscsere
- „Az idő pénz”

Kisebb a költségvonzat

- Olcsóbb egy szett, mint napi 10-15 kötés
- Rövidebb kezelés (ITO is)
- Kevesebb antibiotikum
 - Mert az NPWT „lokalizálja” a szeptikus folyamatokat
- Kevesebb a fertőtlenítőszer, kötszerigény
- Rövidebb a táppénzes időszak
 - Munkahely megtartás
 - A munkavállaló és a munkáltató is „jól jár”

Evidencia

Fasciitis necrotisans





Evidencia

Abdominális kompartment szindróma, akut pancreatitis




Evidencia

Sternoclavicularis ízület gennyes



Evidencia

Hálógennyedés






Evidencia

Enteroatmosphericus sipoly




Evidencia

Rectovaginális sipoly



Evidencia

Endo-vákuum kezelés



Következtetések

- **A negatívnyomás-kezelés kedvező hatásai miatt**
 - Gyorsítja a sebgyógyulást
 - Csökkenti az ápolási időt
 - Csökkenti a kezelés költségét
 - A kezelést a betegek jól tolerálják (QL)
 - A komplikált sebek eredményesebben kezelhetők

Következtetések

- Az NPWT kedvező hatása még jobban kihasználható, ha nem, mint „ultimum refugium” alkalmazzuk a kezelési algoritmusban
- Egyes kórképekben a jó eredmények alapján első vonalbeli kezelésként lehet és kell alkalmazni



Köszönöm a figyelmet!